


3354500 3355000 3355500 3356000 3356500 3357000 3357500 3358000

5860500
5860000
5859500
5859000
5858500
5858000
5857500



Hydromorphologische Seeuferkartierung im GEK Rhin 1 + 2

Ruppiner See - Blatt 4 (Süd)

Schematische Banddarstellung der hydromorphologischen Beeinträchtigung der Seeuferzone.
Uferparallele Zonierung in 100 m-Abschnitten entlang einer generalisierten Uferlinie. Ufervertikale Zonierung in Sublitoral, Eulitoral und Epilitoral. Die dargestellte Breite dieser Ufersubzonen ist schematisch und entspricht nicht ihrer tatsächlichen Ausdehnung.

Legende

Beeinträchtigungsindex

-  1,00 - 1,50 naturnah, unverändert
-  1,51 - 2,00 sehr gering verändert
-  2,01 - 2,50 gering verändert
-  2,51 - 3,00 deutlich verändert
-  3,01 - 3,50 stark verändert
-  3,51 - 4,00 sehr stark verändert
-  4,01 - 4,50 übermäßig verändert
-  4,51 - 5,00 technisch, lebensfeindlich

Stand: 31.07.2011

Maßstab: 1:20.000

Bezugssystem: ETRS 1989 UTM Zone33N

Bearbeiter: ecoconcept + pictures - EcoDataDesign
im Planungsteam GEK 2015
ube - Lp+b - IPS



ecoconcept+pictures

EcoDataDesign

Büro für Ökologie und Datenmanagement

0 100200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
Meter